



Information om udsættelse for mæslingesmitte

Der er konstateret mæslinger hos et barn i Karise Børnehus. Barnet var smittet med mæslinger i perioden fra ca. d. 19. februar til d. 25. februar 2019, hvor det nogle af dagene var i børnehuset.

Hvad du skal vide

Hvis en person har fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFR-vaccineret, kan personen regnes for beskyttet mod mæslinger. De fleste voksne født før 1975 vil have haft mæslinger og vil dermed være beskyttet mod sygdommen. Vaccinationsprogrammet blev iværksat i 1987. Vaccinationsprogrammet omfatter et tilbud om vaccination, når barnet er 15 måneder gammelt, og når det er 4 år gammelt.

Den 5. marts 2019

Ikke-vaccinerede børn og yngre voksne tilhører derfor den mest udsatte gruppe for at få sygdommen.

Mæslinger:

Mæslinger er en akut virussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation. Efter 3-7 dage får man et storpletet udslæt, der breder sig ned over kroppen. Man smitter indtil fem dage efter at udslættet er begyndt. Sygdommen er normalt overstået efter en uges tid, men man er ofte træt og uoplagt i længere tid bagefter. Komplikationer i form af andre infektioner, f.eks. lungebetændelse, kan støde til. En alvorlig, men *sjælden* komplikation er hjernebetændelse.

Der går 8 - 11 dage fra smitte til de første symptomer viser sig og 13 - 14 dage fra smitte til udslæt fremkommer. Patienter kan smitte fra de første symptomer viser sig indtil 5 dage efter fremkomst af udslæt og er mest smittomme lige før udslættet tilkommer.

Hvad du skal gøre

Opstår der symptomer på mæslinger inden for de nærmeste uger, kontaktes den praktiserende læge eller vagtlæge telefonisk. Der oplyses om, at man muligvis har været udsat for mæslinger, så der kan aftales en mødetid / -sted, hvor der ikke er risiko for, at andre kan smittes.

Med venlig hilsen

Jeppe Nørgaard Rasmussen
Overlæge

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. +45 7228 6600
Email stps@stps.dk

www.stps.dk